

?? , 16. Mai 2010

Erste Einschätzungen: Ackerling, Faserling, weniger Risspilz

Am Wegrand gewachsen mit ca 2,5 cm Durchmesser
Sehr weicher Hut Milder Geschmack

Es resultierte:

Makrobeschrieb

Hutbreite Klein, hier 25 mm, cremeweisslicher Hut und wenig ocker und rosa im Weisslichen fleckig verteilt

Hutform Ausgebreitet nicht gebuckelt
Am Rand feines hängendes Velum

Huthaut: Nicht abziehbar, wenig faserig bis Wattig wenig über die Lamellen stehend.
Randseitig oben etwa 10 mal einwenig aufgerissen. Aussen zottig gefasert

Lam.: Durchmischt, graulich, bräunlich, rosa angehaucht , Lam. Ange wachsen und kaum sichtbar herablaufend
Schneiden weisslich unter der Lupe und sehr fein gesägt

Fleisch: Weiss, Wattig, mild, pilzig
Wie würzpilzig

Stiel.: 35 x 3(3,5) mm; Spitze weiss und durch Lamellendruck gerieft
Unter dem hängenden, flüchtigen Manschettlein weiss und etwas faserig, nicht hohl

Basis Abgebogen



Sporenformen



Sporenfarbe A9/A11



Mikroskopische Untersuchungen

Sporen: Ovale und glatte Sporen
Apiculus seitlich fast vorne platziert

Länge	12.0	11.0	12.0	11.3	12.0	12.0	13.0	11.5	11.5	12.0	Mittelwert Ø in mm
Breite	7.0	7.0	7.0	6.5	6.5	7.0	7.0	6.5	7.5	7.0	11.8
											6.9

Verhältniszahl Länge zu Breite: 1,71
Sporenfarbe: dunkelbraun

Weitere Vergrößerungen:

Cheilozyst.: Gerundet - dickkeulig

Vorkommen Gemeinde : Zizers
Wetterlage : Feucht u. kalt seit 2 Wo
Lokalität u. Substrat: Südlich am ungeteerten Molinärwegrand im Gras

Entscheidungsentwicklung: *Fehlt noch*